

TABLEAU 1 ANNEXE

Indicateurs de santé sexuelle et reproductive sélectionnés pour 37 pays subsahariens disposant de données des Enquêtes démographiques et de santé, réalisées entre 2007 et 2018

Pays et année	Indice synthétique de fécondité (naissances par femme*)	Indice synthétique de fécondité désirée (naissances par femme†)	% de naissances récentes non planifiées‡	% de femmes (15–49 ans) utilisant une méthode de contraception moderne§		% de femmes (15–49 ans) ayant des besoins non satisfaits de contraception moderne**,§		Âge médian au premier rapport sexuel	Âge médian au premier mariage
				Mariées	Sexuellement actives, célibataires††	Mariées	Sexuellement actives, célibataires††		
AFRIQUE AUSTRALE									
Afrique du Sud, 2016	2,6	2,0	55	54	64	15	24	18,0	31,1
Eswatini, 2006–2007	3,8	2,1	67	48	63	28	30	18,2	25,6
Lesotho, 2014	3,3	2,3	52	60	72	19	22	18,5	21,0
Namibie, 2013	3,6	2,9	53	55	78	18	15	19,2	30,4
AFRICA CENTRALE									
Angola, 2015–2016	6,2	5,2	35	13	27	39	45	16,7	20,4
Cameroun, 2018	4,8	4,3	21	15	43	27	38	17,3	20,6
Congo, 2011–2012	5,1	4,8	31	20	43	43	43	16,3	19,7
Gabon, 2012	4,1	3,4	41	19	45	38	39	17,1	22,1
Guinée équatoriale, 2011	5,1	4,4	30	10	17	37	nd	16,4	21,2
RDC, 2013–2014	6,6	5,7	32	8	21	40	64	17,0	19,3
Sao Tomé-et-Principe, 2008–2009	4,9	3,3	53	34	46	42	39	17,8	19,2
Tchad, 2014–2015	6,4	6,1	13	5	19	24	58	16,5	16,4
AFRIQUE DE L'EST									
Burundi, 2016–2017	5,5	3,6	34	23	34	35	38	19,6	20,2
Comores, 2012	4,3	3,8	33	14	32	38	58	21,1	21,1
Éthiopie, 2016	4,6	3,6	25	35	55	23	30	18,6	19,0
Kenya, 2014	3,9	3,0	38	53	61	22	31	18,1	20,5
Madagascar, 2008–2009	4,8	4,2	13	29	29	29	51	17,1	18,2
Malawi, 2015–2016	4,4	3,4	43	58	43	20	41	17,4	18,6
Mozambique, 2011	5,9	5,2	16	11	30	24	41	16,1	18,1
Ouganda, 2016	5,4	4,3	44	35	47	33	35	17,6	19,4
Rwanda, 2014–2015	4,2	3,1	38	48	35	25	48	21,5	22,8
Tanzanie, 2015–2016	5,2	4,5	34	32	46	29	33	17,5	19,7
Zambie, 2018	4,7	4,0	38	48	43	22	43	16,9	19,8
Zimbabwe, 2015	4,0	3,6	35	66	66	11	21	18,6	19,5
AFRIQUE DE L'OUEST									
Bénin, 2017–2018	5,7	4,9	26	12	24	35	56	17,4	19,8
Burkina Faso, 2010	6,0	5,4	9	15	59	26	33	17,5	17,9
Côte d'Ivoire, 2011–2012	5,0	4,5	27	12	30	33	53	16,9	20,5
Gambie, 2013	5,6	4,9	15	8	42	26	43	19,3	19,6
Ghana, 2014	4,2	3,6	33	22	32	34	55	18,6	22,4
Guinée, 2018	4,8	4,3	16	11	51	22	37	16,8	18,5
Libéria, 2013	4,7	4,2	32	19	35	32	49	16,2	19,9
Mali, 2018	6,3	5,5	16	16	35	25	52	16,8	17,7
Niger, 2012	7,6	7,4	10	12	40	18	52	16,2	16,0
Nigéria, 2018	5,3	4,8	11	12	28	24	58	17,4	19,0
Sénégal, 2017	4,6	4,0	22	26	46	23	47	20,0	20,5
Sierra Leone, 2013	4,9	4,5	14	16	56	26	30	16,6	18,2
Togo, 2013–2014	4,8	4,1	29	17	38	36	44	18,1	20,2

Voir page suivante pour les notes.

TABLEAU 2 ANNEXE

Estimations des indicateurs pour les avortements, les grossesses et les naissances pour toute l'Afrique subsaharienne et ses quatre sous-régions

	Afrique subsaharienne	Afrique australe	Afrique centrale	Afrique de l'Est	Afrique de l'Ouest
	2019	2019	2019	2019	2019
Femmes					
Nb. âgées 15–49	255 257 744	18 056 938	39 858 490	106 014 503	91 327 813
% par sous-région	100	7	16	42	36
	2015–2019 (IC)	2015–2019 (IC)	2015–2019 (IC)	2015–2019 (IC)	2015–2019 (IC)
Avortements					
Nb. (en millions)	8,0 (7,0, 9,2)	0,5 (0,3, 1,0)	1,2 (0,8, 1,7)	3,5 (3,0, 4,0)	2,7 (2,2, 3,4)
Taux*	33 (29, 38)	30 (15, 58)	32 (21, 46)	35 (30, 40)	32 (25, 39)
Grossesses					
Nb. (en millions)	52,5 (51,2, 53,9)	2,3 (2,0, 2,8)	9,4 (8,8, 10,0)	20,9 (20,3, 21,5)	19,8 (19,1, 20,7)
Taux*	218 (212, 223)	130 (113, 159)	250 (237, 266)	209 (203, 216)	230 (221, 240)
% non planifiées	42 (40, 43)	65 (59, 72)	43 (39, 46)	47 (45, 49)	33 (30, 35)
Grossesses non planifiées					
Nb. (en millions)	21,9 (20,7, 23,3)	1,5 (1,2, 2,0)	4,0 (3,5, 4,6)	9,9 (9,3, 10,5)	6,5 (5,8, 7,2)
Taux*	91 (86, 96)	84 (68, 113)	106 (93, 122)	99 (93, 106)	75 (67, 83)
% aboutissant sur avortement	37 (34, 40)	36 (22, 51)	30 (23, 38)	35 (32, 39)	42 (37, 48)
Naissances non planifiées					
Nb. (en millions)	10,9 (10,4, 11,4)	0,8 (0,7, 0,8)	2,2 (2,0, 2,4)	5,0 (4,7, 5,4)	2,9 (2,6, 3,2)
Taux*	45 (43, 47)	43 (39, 47)	59 (53, 65)	51 (48, 54)	33 (30, 37)
% de naissances non planifiées	30 (29, 31)	53 (49, 57)	33 (30, 36)	36 (34, 38)	21 (19, 23)
	2019	2019	2019	2019	2019
Taux de létalité par avortement†	185	29	259	157	224
	2010–2014	2010–2014 (IC)	2010–2014 (IC)	2010–2014 (IC)	2010–2014 (IC)
% d'avortements par sécurité‡					
Sécurisés	23	74 (28, 93)	12 (6, 30)	24 (17, 33)	15 (10, 24)
Moins sûrs	28	19 (2, 62)	19 (7, 41)	29 (20, 38)	33 (24, 43)
Les moins sûrs	49	7 (3, 11)	69 (38, 81)	47 (37, 55)	52 (40, 60)
Total	100	100	100	100	100

*Nombre pour 1 000 femmes âgées 15–49. †Nombre de décès maternels pour 100 000 avortements. ‡Les avortements sécurisés sont ceux pour lesquels un prestataire qualifié utilise une méthode recommandée par l'Organisation mondiale de la Santé suivant l'âge gestationnel; ceux moins sûrs ne satisfont qu'à un de ces critères; et ceux les moins sûrs ne répondent à aucun des deux. NB: IC = intervalles de crédibilité (pas disponibles pour la distribution par sécurité de l'Afrique subsaharienne entière). Sources: références 2, 5, 7, 8 et 24.

Voir Tableau supplémentaire en ligne pour les données d'années additionnelles:

<https://www.guttmacher.org/fr/report/from-unsafe-to-safe-abortion-in-sub-Saharan-africa>

Notes au Tableau 1 en annexe.

*Nombre de naissances par femme, en supposant que les taux de fécondité par âge des trois dernières années restent identiques tout au long de sa vie. †Nombre de naissances par femme si celles dépassant le nombre idéal déclaré étaient évitées. ‡Somme des naissances survenues à un moment inopportun (désirées, mais plus tard) et des celles non désirées (pas désirées du tout) durant les trois dernières années. §Les méthodes modernes de contraception comprennent la stérilisation féminine et masculine, la pilule, le DIU, la contraception injectable, la contraception d'urgence, l'implant, le préservatif masculin et féminin, la méthode de l'aménorrhée lactationnelle, le diaphragme, les spermicides et la méthode des jours fixes. **Proportion des femmes capables de concevoir qui ne désirent pas de grossesse durant les deux prochaines années mais qui ne pratiquent aucune méthode contraceptive moderne. ††A eu des rapports sexuels durant le dernier mois écoulé. NB: Pour assurer l'utilité des données et la comparabilité, les âges médians sont calculés sur la base de la première tranche d'âge dans laquelle 50% des femmes avaient vécu les deux événements, premier rapport sexuel et premier mariage. Quatre tranches d'âge de base ont ainsi servi à calculer les médianes pour les 37 pays repris dans ce tableau. Ces tranches d'âge et pays sont: **20 à 24 ans** — Bénin, Burkina Faso, Congo, Éthiopie, Guinée, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Niger, Nigéria, Ouganda, RDC, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Tanzanie, Tchad et Zimbabwe; **25 à 29 ans** — Angola, Burundi, Cameroun, Comores, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée équatoriale, Gambie, Ghana, Kenya, Lesotho, Rwanda, Sénégal, Togo et Zambie; **30 à 34 ans** — Eswatini; et **35 à 39 ans** — Afrique du Sud et Namibie. nd = non disponible. RDC=République démographique du Congo. Sources: tableaux spéciaux des ensembles des données, sauf le Cameroun, 2018, et la Guinée équatoriale, 2011. Pour ces deux pays, nous avons consulté les rapports d'enquêtes publiés; dans ces cas, l'état de planification fait référence aux naissances survenues durant les cinq dernières années, y compris les grossesses en cours.